

头部和颈部手术后携带引流管回家

什么是引流管？为什么我需要它？


- 引流管用于清除积攒在手术部位的液体。通过减轻局部肿胀，引流管有助于伤口尽快愈合。
- 术后引流管通常会保留直至少量引流液流出，约至 5 天时间。

为什么鼓励携带引流管回家？

- 经过术后 1 至 2 天的观察，大多数患者可以自主行走、进食以及独立照顾自己。
- 接下来的几天，住院时间仅仅是等待拔除引流管。
- 引流管护理简约和不复杂。了解如何在家护理引流管后，您可以早日出院，与家人共度美好时光。

如何护理引流管？

1. 以下是引流管的参考图：



以上图片由李医生提供

2. 参考以下图片，如何将引流管固定在颈部

耳鼻喉科（耳朵，鼻子和喉咙），1B 诊所

陈笃生医疗中心，1 楼 | 联络热线：6889 4180 (工作时间：9.00am – 5.00pm)



a. 将引流管贴在脖子上
以上图片由李医生提供



b. 随身携带引流瓶

引流管可能会出什么问题和如何解决他们?

1. 失去负压吸引

- 引流瓶制造了一个负压环境从而将术野中的液体吸除。
- 除非您的医生有特殊指示，引流瓶应当时刻保持负压状态。
- 如果负压指示器扩张开来(以下图)，意味着引流瓶内负压丢失。
- 若发生这种情况，请您立即回医院寻求医生或护士的帮助。在工作时间（周一至周五，早上 9 点至下午 5 点）您可以直接到陈笃生医院门诊部门 1B 耳鼻喉科就诊；在周末或非工作时间，您可以到陈笃生医院急诊部门就诊。



负压丢失后负压指示器会扩张

以上图片由李医生提供

2. 引流管被夹闭

- 引流管必须松开，让引流装置正常运行。
- 如果您看到引流管被夹闭，请立即打开引流管（如以下图）

耳鼻喉科（耳朵，鼻子和喉咙），1B 诊所

陈笃生医疗中心，1 楼 | 联络热线: 6889 4180 (工作时间: 9.00am – 5.00pm)



错误：引流管被夹闭。


以上图片由李医生提供



正确：引流管开放。

3. 管瓶分离

- 引流管应始终与引流瓶相连。
- 如果管瓶意外分离，您可以先用酒精拭或清洁毛巾擦拭两端，然后将引流管与引流瓶紧紧拧在一起。



将引流管和引流瓶紧紧地拧在一起。

以上图片由李医生提供

4. 引流瓶满盈

- 如果引流瓶内液体满盈，则需更换引流瓶。但这种情况极少在出院之后发生。
- 若引流满盈，您需要回到陈笃生医院门诊部 1B（周一至周五，早上 9 点至下午 5 点）或急诊部门（周末或非工作时间）。我们的医生会检查您的伤口以及为您更换引流瓶。

如何寻求帮助？

耳鼻喉科（耳朵，鼻子和喉咙），1B 诊所

陈笃生医疗中心，1 楼 | 联络热线：6889 4180（工作时间：9.00am – 5.00pm）

PECC-ENT-ED-2021-1133C-v1

周一至周五，早上 9 点至下午 5 点：陈笃生医院门诊部 1B 耳鼻喉科。
电话：(+65) 6889 4180

周一至周五早上 9 点之前及下午 5 点之后，周末和节假日：陈笃生医院急诊部门，或联系陈笃生医院热线 (+65) 6256 6011，与耳鼻喉值班医生联系。

耳鼻喉科 (耳朵, 鼻子和喉咙), 1B 诊所
陈笃生医疗中心, 1 楼 | 联络热线: 6889 4180 (工作时间: 9.00am – 5.00pm)

PECC-ENT-ED-2021-1133C-v1