

癌症患者紧急部门就诊须知



如果您有以下任何一种症状，请即刻到紧急部门就医：

1. 受感染的迹象，如发烧（体温为 38°C 或以上），发冷和发抖。避免服用 Paracetamol (Panadol®) 来缓解发烧。服用 Paracetamol (Panadol®) 可能会掩盖发烧的症状，从而延误感染的治疗。
2. 出血的迹象，例如尿液或粪便中出现的大量鲜血液，或黑色粘稠的粪便，或显着和/或多处瘀伤。
3. 化疗的注射部位严重红肿或疼痛。
4. 过敏反应的迹象，例如脸肿，严重的皮疹或呼吸困难。
5. 腹泻或每天排便次数超过 3 次（包括排便袋排出更多的物体），特别是如果它明显超过您通常排便的次数或与中度至重度腹痛相关。
6. 尽管服用了止呕吐药物，每天还呕吐超过 3 至 4 次，或严重或长期食欲不振，使食物和饮料摄入量大大减少超过一天。
7. 心脏或肺部问题的症状，例如呼吸困难，胸口痛或腿部突然肿胀。
8. 其他中度至重度疼痛或不适的症状，您的医生，护士，药剂师未提及/或药物治疗不足以缓解的症状。

这不是一个详尽的清单，如果有任何严重或危及生命的副作用，请到紧急部门就医。