

## PHARMASI

### Informasi Ubat

Tanda dan gejala untuk pergi ke jabatan kecemasan trauma (A & E) untuk pesakit yang menerima terapi sistemik anti kanser



#### Segeralah ke Pusat Kecemasan jikalau terdapat :

1. Tanda- tanda infeksi seperti demam dengan suhu badan 38 degree selsius atau lebih, atau rasa seram sejuk. Pengambilan ubat Paracetamol (Panadol) tidak dibenarkan untuk melegakan demam, sebab ia boleh meredakan suhu badan yang tinggi lantas mengaburi tanda-tanda infeksi.
2. Tanda-tanda pendarahan yang banyak seperti darah di dalam air kencing, kelihatan najis yang berwarna hitam atau ada kesan lebam yang besar/banyak.
3. Kemerahan yang besar atau berlebihan di bahagian suntikan.
4. Tanda-tanda alahan seperti muka yang bengkak, ruam merah atau sesak nafas.
5. Cirit-birit yang melebihi 3 kali sehari (termasuk dari beg stoma), terutama sekali jika ia melebihi kebiasaan dalam sehari untuk anda, atau ia dikaitkan dengan rasa sakit perut yang berlebihan.
6. Muntah- muntah yang melebihi 3-4 kali sehari atau hilang selera makan melebihi sehari walaupun sudah mengambil ubat pencegahan muntah.
7. Tanda-tanda sakit jantung atau paru-paru seperti sesak nafas, sakit dada atau kaki bengkak yang terjadi secara mendadak.
8. Tanda-tanda yang lain seperti rasa kurang selesa atau rasa sakit yang berlebihan yang tidak disebutkan oleh doktor, jururawat, ahli farmasi, atau pengambilan ubat yang ditetapkan tidak mencukupi untuk menangani tanda tanda berikut.

Tanda-tanda yang disenaraikan di atas tidak terhad. Segeralah ke Jabatan Kecemasan jika terdapat lain-lain tanda kesan sampingan yang boleh mengancam nyawa.