

1. علامات الالتهاب مثل حمّى مع درجة حرارة 38 أو أعلى ، قشعريرة وارتعاش. تجنب تناول الباراسيتامول (بانادول) لتخفيف الحمى. انتبه إلى أن تناول الباراسيتامول قد يخفي الحمى وبالتالي يؤخر علاج الالتهاب.
  2. علامات النزيف مثل كمية كبيرة من الدم الحديث في البول أو البراز، أو براز لزج أسود، أو كدمات كبيرة و / أو متعددة.
  3. احمرار شديد، ألم وتورم في موقع الحقنة.
  4. علامات الحساسية مثل تورم الوجه، طفح جلدي كبير أو ضيق في التنفس.
  5. الإسهال / زيادة في عدد مرات التبرز أكثر من 3 مرات في اليوم (بما في ذلك زيادة كمية التبرز من الفغرة المعوية الـ"ستوما")، خاصة إذا كان أكثر من عدد مرات التبرز المعتاد أو إذا كان مصحوباً بألم بطني متوسط إلى شديد.
  6. القيء أكثر من 3 إلى 4 مرات في اليوم، أو فقدان الشهية الشديد أو لمدة طويلة مؤثراً على الأكل والشراب لأكثر من يوم، على الرغم من تناول الأدوية المانعة للقيء.
  7. الأعراض التي قد تشير إلى مشاكل في القلب أو الرئة مثل صعوبة في التنفس، ألم في الصدر، أو تورم مفاجئ في الأرجل.
  8. أي أعراض أخرى من الألم أو الانزعاج بنسبة متوسطة إلى شديدة لم يذكرها الطبيب، الممرض، أو الصيدلي أو أن الأدوية التي أعطيت لك غير كافية لتخفيف هذه الأعراض.
- هذه ليست قائمة شاملة، يرجى التوجّه إلى قسم الطوارئ إذا كان هناك أي آثار جانبية خطيرة أو تهدد الحياة.

## الصيدلية معلومات عن الأدوية

علامات وعوارض تستدعي الذهاب لقسم الطوارئ للمرضى الذين يتلقون علاجاً للسرطان.